

GUÍA DE AVES

del Parque Sarmiento

Dirección de Educación Ambiental Ente BioCórdoba

Nosotros

Dr. Martín Llaryora

Intendente Municipal Ciudad de Córdoba

Dr. Daniel Passerini

Viceintendente Municipal Ciudad de Córdoba

Mgtr. Jorge Gustavo Folloni

Secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Enzo Cravero

Presidente Ente BioCórdoba

Julio Tejeda

Vocal Ente BioCórdoba

Soledad Lassaga

Vocal Ente BioCórdoba

Lic. Juliana García Aresca

Directora del Área de Educación Ambiental

Equipo de trabajo del Área de Educación Ambiental

Tec. Universitario en Guardaparque Federico Rosas

Tec. Sup. en Conservación de la Naturaleza Laureano Zanello

Tec. Universitario en Guardaparque Pablo Morales

Consultor externo

Biol. Guillermo Sferco

Fotógrafos

Se detalla en cada fotografía las iniciales de su autor:

Federico Rosas (FR)

Eimi Pouli (EP)

Marcelo Zanello (MZ)

Lia Nela Nobile (LN)

Christian Relling (CRE)

Octavio Relling (OR)

Macarena Delsoglio (MD)

Lorenzo Vietto (LV)

Francisco Pereyra (FP)

Claudio Rosso (CRO)

Equipo de Diseño

Guillermo Suárez

Nayla Bigón

Índice

Introducción y objetivos	4
• El Parque Sarmiento	4
• La observación de aves en Córdoba	4
• Especies incluidas	5
Taxonomía	5
Recomendaciones para la observación de aves	5
Cómo usar esta guía	6
Topografía de las aves	7
Fichas de aves	9
Especies registradas en algún momento en el Parque pero no frecuentes	48
Glosario	50
Bibliografía	51
Índice de especies en orden alfabético	52



Desde el área de Educación Ambiental del Ente Municipal BioCórdoba nos dedicamos a promover la educación ambiental comunitaria para generar una sociedad más comprometida con el ambiente, la conservación de los recursos naturales y que respeta la biodiversidad, afianzando el involucramiento de todos los cordobeses. De esta manera, fomentamos procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados a promover prácticas sustentables.

Dirección de Educación Ambiental Ente BioCórdoba
Lic. Juliana García Aresca



Introducción

La presente guía tiene el objetivo de dar a conocer la gran diversidad de aves que habitan el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Las mismas han sido registradas y recopiladas por el equipo de trabajo del área de Educación Ambiental en los últimos años mediante diferentes formas de relevamiento, como monitoreos específicos y avistajes ocasionales.

Esta iniciativa apunta a revalorizar el espacio del Parque Sarmiento y difundir la actividad de observación de aves. La realización de una guía con las especies de aves frecuentes que habitan el Parque, puede aportar a conocer desde otra mirada este espacio tan icónico y famoso de nuestra ciudad. Por último, esta guía se ofrece como material educativo accesible para los diferentes niveles educativos, como así también para cualquier persona que quiera introducirse en el mundo de la observación de aves, tenga o no conocimientos previos sobre el tema.

El espacio: “El Parque Sarmiento”

El Parque Sarmiento es un gran espacio verde ubicado en cercanías a la zona céntrica de la Ciudad de Córdoba, con una superficie de 55 hectáreas aproximadamente. Este fue el primer paseo público creado en nuestro país y uno de los más antiguos de Sudamérica. Fue obra del reconocido arquitecto francés Carlos Thays y su construcción se inició en el año 1889, finalizando en 1911. Lleva su nombre en referencia a Domingo Faustino Sarmiento, ex-presidente de la República Argentina. En el año 2017 fue declarado Monumento Histórico Nacional por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, reconociendo su valor histórico, urbano, paisajístico y artístico.

Hoy en día se constituye como uno de los “pulmones verdes” más importantes de la ciudad de Córdoba. Estos espacios naturales y culturales son sumamente vitales para cualquier gran ciudad y sus habitantes, ya que aportan grandes beneficios a través de su vegetación: la disminución del smog y la polución urbana, la reducción de la temperatura y el contacto directo con la naturaleza. Estos beneficios impactan en el bienestar físico y emocional de las personas, mejorando su calidad de vida.

El Parque Sarmiento se encuentra actualmente administrado por el Ente Municipal BioCórdoba, que además de ocuparse del mantenimiento y la recuperación de distintos sectores, desarrolla diferentes actividades como visitas guiadas, talleres y jornadas destinadas al público en general, apuntando a su revalorización como patrimonio local.

La observación de aves en Córdoba

En la provincia de Córdoba confluyen tres ecorregiones: Espinal, Chaco Seco y Llanura pampeana, dotando a su geografía de una rica diversidad de paisajes. Además de sus conocidos valles, ríos y serranías, también se encuentran otros paisajes como bosques, salinas y lagunas dulces y saladas. Estos ambientes presentan una abundante biodiversidad, propiciando el desarrollo de diferentes actividades, como la observación de aves.

Las Áreas naturales protegidas de Córdoba, son lugares claves para el avistaje de la fauna silvestre y su conservación. Algunos de las Áreas más reconocidas son: el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en donde se pueden contemplar algunas especies icónicas como el Cóndor andino, el Parque Nacional y Reserva Provincial de usos múltiples Mar de Ansenusa, una inmensa laguna de agua salada que recibe una gran cantidad de especies acuáticas migratorias; entre ellas los emblemáticos flamencos; y la Reserva Provincial de usos múltiples Salinas Grandes, hábitat de la Monjita Salinera, una especie endémica de la región.

En la ciudad de Córdoba se encuentra la Reserva Natural Urbana Gral. San Martín, con una extensión de 114 hectáreas, camping y servicios. Posee una importante diversidad de avifauna que puede ser divisada recorriendo sus diferentes senderos.

Especies incluidas en esta guía

Para esta guía se decidió incluir 78 especies de aves más “comunes” o frecuentes de observar en el Parque Sarmiento, en base a los criterios de probabilidad y frecuencia de avistaje, organizadas taxonómicamente. Sin embargo, al final de esta guía se incorpora un listado con apariciones de aves ocasionales y llamativas en este espacio, dada su distribución y hábitat.

Taxonomía

Las aves son una clase de animales que se encuentran en todo el planeta caracterizados por poseer plumas, pico y poner huevos. Las especies dentro de este grupo tienen la capacidad de volar, nadar y/o caminar. Esta clase se encuentra dividida en diferentes órdenes taxonómicos, pero para simplificar su conocimiento se pueden distinguir en *Passeriformes* y *No Passeriformes*. Los *Passeriformes* o también llamados “pájaros” están representados por las aves que tienen como característica distintiva, un órgano de fonación llamado siringe más desarrollado que el resto, el cual les permite emitir sonidos más elaborados y melodiosos tales como los zorzales, la reinamora y el cardenal, entre otros. En cuanto a los *No Passeriformes*, son aves que presentan una gran diversidad morfológica, pudiendo encontrar aves de todo tipo y tamaño, como pingüinos y ñandúes, hasta picaflores y carpinteros.

Sean *Passeriformes* o *No passeriformes*, la gran mayoría de las aves emiten sonidos. Estos son principalmente sus vocalizaciones o cantos, pero también pueden reconocerse de manera auditiva por algún comportamiento como tamborileos y aleteos.

Recomendaciones para la observación de aves en el Parque

Si bien en cualquier momento del día es posible observar aves en el Parque, los mejores horarios son el amanecer y el atardecer, ya que en estos momentos del día la actividad de las aves es mayor. Las condiciones climáticas y la época del año influyen, ya sea aumentando la probabilidad de avistamientos o viceversa. Por ejemplo, los días soleados o luego de las lluvias, son momentos propicios para mayores conteos mientras que, en los días ventosos, la actividad disminuye considerablemente. Los eventos migratorios de las aves pueden modificar notoriamente sus poblaciones y su diversidad, volviendo más dinámica e interesante esta actividad.

Es recomendable utilizar vestimenta cómoda de colores claros, ya que éstos no alertan a las aves. Contar con agua y un sombrero es indispensable para la realización de esta actividad. Asimismo las guías de aves, binoculares, cámara fotográfica y cuadernos de campos son herramientas que pueden facilitar la actividad; pero no resultan indispensables.

Cómo usar esta guía

Cada especie incluida en esta guía está identificada por su nombre común, científico y en inglés con su correspondiente fotografía. Se añade una descripción sobre sus características principales o más notorias para su fácil reconocimiento. La diferenciación entre machos y hembras aparecerá sólo en caso de que la especie presente un marcado dicromatismo (coloraciones distintas en su plumaje) o dimorfismo.


Iconografías de referencias:




ZONA EN DONDE PODEMOS ENCONTRARLO




Topografía de las aves




- 1- Corona
- 2- Pico
- 3- Garganta
- 4- Ventre
- 5- Ceja
- 6- Línea Ocular
- 7- Pecho



- 1- Periocular
- 2- Iris
- 3- Comisura
- 4- Malar
- 5- Mejilla
- 6- Nuca
- 7- Auricular




1- Narina
2- Vibrisas



1- Escudete



1- Copete



1- Semicopete
2- Dorso
3- Lomo
4- Rabadilla
5- Cola

Pato de Collar

Callonetta leucophrys
Ringed Teal

35 cm. En grupos o pareja. Pato llamativo por su **pico celeste y patas rosadas**. Cabeza y cuello blancuzcos. Parte superior de la cabeza, nuca, semicollar y subcaudal negro. **Collar blanco**. Pecho rosáceo con pintas negras. Ventral y laterales blanco estriados de negro. Dorsal castaño. Alas negras con espejo verde y mancha blanca. ♀: Menos colorida, pico negro amarronado, ventral blanco barrado de marron, dorso pardo. Marcadas ceja, mejilla y garganta blancas.



LAGO

Frecuencia de observación



BAJA



FR



Pato Barcino

Anas flavirostris
Speckled Teal

33 cm. En grupos o pareja. Pato de colores opacos. **Pico amarillo** notable con línea central y punta negra. **Coloración general ocre moteado de negro**. Iris negro. Ojo con contorno oscuro.



LAGO

Frecuencia de observación



ALTA



FR

Paloma Doméstica

Columba livia
Rock Pigeon

EP

Exótica. 32 cm. **En grupos.** Confiada. Acostumbrada a la presencia humana. Generalmente presenta coloraciones grisáceas con dos líneas negras en las alas. **Iris anaranjado.** Pico negro. En el **cuello presenta brillos verdes y violáceos.** Existe una gran variación de coloraciones; algunas tienen dominancia del blanco, otras del negro o diversas combinaciones.



LAGO

Frecuencia
de observación



ALTA



Paloma Picazuró

Patagioenas picazuro
Picazuro pigeon

FP

34 cm. La paloma más grande que puede encontrarse en el Parque. Solitaria. Arisca. La coloración general es gris vinosa con tonos violáceos. **Escamas celestes en el cuello.** Iris rojo intenso. Borde de las alas blancas, lo que en vuelo se nota como una **medialuna blanca** que facilita la identificación.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD

Frecuencia
de observación



BAJA



Paloma Manchada

Patagioenas maculosa
Spot-winged pigeon

OR

33 cm. Coloración general grisácea. Alas oscuras con bordes blancos y **pequeñas manchas blancas** que le dan el nombre. Iris marfil. Patas rojas. Cuello sin escamas ni coloraciones brillosas.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Torcacita Picuí

Columbina picui
Picui ground-dove

18 cm. La más pequeña de todas las palomas que se encuentran en el Parque. Suele andar en pareja o solitaria. **De color ceniciento con la cabeza gris celeste**, en el borde del **ala presenta una línea blanca sobre una negra**. Pecho gris y vientre blanco. Iris violáceo. ♀: Más parda/apagada.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



BAJA



Torcaza

Zenaida auriculata
Eared dove

FR

26 cm. Confiada. **Coloración general grisácea**, con algunas tonalidades rosas en el pecho. **Alas grises con manchas negras**. Zona auricular también con manchas negras. Iris oscuro. Plumas tornasoladas a los lados del cuello.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Pirincho

Guira guira
Guira cuckoo

FR

36 cm. Bullanguero. En grupos. **Gran copete despeinado**. Cara de coloración parda. Dorso y alas negras. Lomo y rabadilla blancos. Cola de tres colores.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



BAJA



Atajacaminos Ñañarca

Systellura longirostris
Band-winged nightjar

22 cm. Comúnmente en el suelo. Plumaje críptico. La coloración general es negra grisácea con motas canelas y en tonos grises más oscuros. **Punta de las alas negras con una banda blanca** que se aprecia en vuelo. Puntas blancas en las plumas externas de la cola. Notables vibrisas en la comisura del pico e inmediaciones del mismo. ♀: Banda canela en las alas y sin blanco en la cola. No está presente en invierno.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



BAJA



Atajacaminos Tijera

Hydopsalis torquata
Scissor-tailed nightjar

♂ 50 cm ♀ 30 cm. Posa en el suelo o ramas bajas. Plumaje críptico. El ♂ **posee una larga cola ahorquillada con marcadas plumas blancas**, sumando tonalidades pardas. La misma es más larga que el cuerpo. Coloración general pardo grisácea con motas blancas. Vientre ocre con leve barrado. Notables vibrisas en la comisura del pico e inmediaciones del mismo. ♀: Con cola más corta y sin blanco. No está presente en invierno.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



BAJA

Picaflor Cometa

Sappho sparganurus
Red-tailed comet

FR

15 cm. Inquieto recorriendo flores. Territorial. Colores muy brillantes. Cabeza, pecho y vientre verde. Lomo rojo intenso. **Larga cola roja con barras negras.** Alas negras. ♀: Con cola notablemente más corta. Cara, frente y vientre de coloración blancuzca. Sólo se lo puede observar en invierno.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD


Frecuencia
de observación



BAJA



MZ



Picaflor de Barbijo

Helimaster furcifer
Blue-tufted starthroat

FR

10 cm. Notable **pico oscuro, más largo que en otros picaflores y levemente curvado.** **Garganta de intenso color rojo.** Parte superior de la cabeza celeste brillante. Dorso verde. Vientre azul violáceo. Pequeña mancha blanca post ocular. Cola furcada. ♀: Con garganta y ventral blanquecino. Cola con pequeñas manchas blancas en la punta.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO

Frecuencia
de observación



MEDIA



CRE



Picaflor Verde

Chlorostilbon lucidus

Glittering-bellied emerald

FR

9 cm. El más conocido. Coloración general **verde esmeralda** con reflejos dorados. Garganta, cuello y cola azul. **Pico naranja** con punta negra. ♀: Con garganta y vientre blancos grisáceos. Cola azulada con punta blanca. Posee una línea postocular blanca. Una faja negra parte del pico y baja por la cara incluyendo el ojo.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



CRO



Pollona Negra

Gallinula galeata

Common gallinule

EP

35 cm. Confiada. En grupos. Se la puede ver caminando fuera del agua. Coloración general gris oscuro con acentuado negro en cuello y cabeza. Alas y posterior del dorso castaño oscuro. **Escudete y pico rojo con punta amarilla**. Tiene una banda blanca discontinua en los costados. Plumas blancas en la parte inferior de la cola. Patas verdes claras con liga roja. Dedos no palmeados. Iris rojizo. J de coloración parduzca con el escudete y el pico de color apagado.



LAGO

Frecuencia
de observación



ALTA



Gallareta Escudete Rojo

Fulica rufifrons
Red-fronted coot

CRO

39 cm. Similar a la Pollona negra. La coloración general es gris oscuro con cabeza y cuello de intenso negro. En el dorso presenta una zona de color castaño. **Escudete rojo, afinado. Pico amarillo con base rojiza.** Notables plumas blancas en la cola. **Iris pardo.** Patas verde amarillentas con dedos lobulados.



LAGO

Frecuencia
de observación



BAJA



Gallareta Ligas Rojas

Fulica armillata
Red-gartered coot

FR

40 cm. La coloración general es muy similar a las dos especies descritas anteriormente. **Escudete y pico amarillo, separados por una mancha roja. Iris rojizo.** Patas rojas anaranjadas con **liga roja** que no siempre es visible. Dedos lobulados de coloración verde opaca. J: con garganta y parte del cuello blancos. Plumas blancas en la cola.



LAGO

Frecuencia
de observación



BAJA



Gallareta Chica

Fulica leucoptera
White-winged coot

FR

35 cm. En grupos. La coloración es similar a las especies descritas anteriormente. **Escudete amarillo, redondeado.** Pico amarillo tenue, con la base y punta más intensas. **Iris rojo.** Patas verde amarillentas con dedos lobulados. Plumas blancas en la cola. Bordes blancos en las alas, apreciable en vuelo. J: con escudete y pico opacos. Garganta y cuello blanquecinos.



LAGO

Frecuencia
de observación



MEDIA



Carau

Aramus guarauna
Limpkin

FR

60 cm. Solitario. Siempre a la vera del agua. Coloración general parduzca. Gran **pico amarillento** con punta oscura. La **parte dorsal del cuello está punteada de blanco.**



LAGO

Frecuencia
de observación



BAJA



Tero

Vanellus chilensis
Southern lapwing

35 cm. Ave muy conocida. **Característico canto que remite a su nombre.** En el suelo y en espacios abiertos. Colorido. Dorso pardo grisáceo, con brillo verde y morado sobre las alas. Copete ubicado en la nuca y pecho negros. Mancha negra rodeando el pico que continúa por debajo y se conecta con el pecho. Alrededor del ojo, iris y patas rojizas. Pico también rojizo pero con punta negra. Posee espolones de color rojizo en las alas.



LAGO



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK

Frecuencia
de observación



MEDIA

FR



Biguá

Nannopterum brasilianum
Neotropic cormorant

68 cm. Solitario o en grupos. Suele verse posado con las alas abiertas para secarse al sol. **Coloración general negruzca** con notable **iris turquesa**. En época reproductiva coloración negro brillante, pico rodeado de blanco con mechones blancos en la cara. Base del pico amarillento. J: Más parduzco y con vientre claro.



LAGO

Frecuencia
de observación



ALTA

FR



Garza Blanca

Ardea alba
Great egret

85 cm. Solitaria. Grande. Cuerpo completamente blanco. **Pico amarillo intenso y patas negruzcas.**



LAGO

Frecuencia de observación



BAJA

FR



Garcita Blanca

Egretta thula
Snowy egret

55 cm. Solitaria o en grupos. Muy parecida a la Garza blanca, de menor tamaño, **pico negro y patas negras con dedos amarillos.**



LAGO

Frecuencia de observación



ALTA

FR



Garcita Azulada

Butorides striata
Striated heron

FR

35 cm. Solitaria. Oculta. **Coloración general gris azulado.** Corona y plumas de la nuca negras. Iris amarillo. Alas de azul más oscuro con detalles de blanco. Dorso con reflejos. **Cuello con notable estriado canela.** Patas amarillas. J: de coloración parduzca grisácea. El estriado del cuello se extiende por el vientre.



LAGO

Frecuencia de observación



MEDIA



Garza Bruja

Nycticorax nycticorax
Black-crowned Night-heron

EP

55 cm. Grisácea. Oculta. Más activa de noche. **Corona y dorso negros bien marcados.** Plumas nucas, ceja y frente blancas. **Iris rojo intenso.** Vientre blancuzco. J: parduzco con estría blancas. Iris anaranjado.



LAGO

Frecuencia de observación



BAJA



FR

J



Jote Cabeza Negra

Coragyps atratus
Black vulture

EP

60 cm. Planea en lo alto. Comúnmente en grupos. Completamente **negro con punta de las alas blancas**, notables en vuelo. Cabeza negruzca, desnuda.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



MEDIA



Taguató

Rupornis magnirostris
Roadside hawk

FR

35 cm. **Cabeza y cuello oscuros con iris amarillento claro**. Pecho estriado con vientre barrado. Dorso pardo oscuro. Punta de las alas canela, notable en vuelo. Cola rufa con barras negras. J: ocráceo con marcas estriadas negras en el pecho y vientre. Ceja marcada. Cabeza clara.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



BAJA



Caburé Chico

Glaucidium brasilianum
Ferruginous Pygmy-owl

FR

17 cm. La lechuza más pequeña. Su coloración general puede variar entre el castaño y el pardo. **Fino estriado blanco en la cabeza.** Dorso parduzco, uniforme. Vientre estriado. Posee dos manchas negras rodeadas de blanco en la nuca denominadas ocelos, que simulan otro par de ojos. **Iris, pico y patas amarillentas.** Cola oscura con barras.



LAGO



LLANURA DE LA CUEVA DEL OSO

Frecuencia de observación



BAJA



Lechucita Vizcachera

Athene cunicularia
Burrowing owl

FR

25 cm. En parejas o grupos familiares. **Usualmente en el suelo o sobre postes.** Dorso pardo con pecas blancas. Cabeza pardo grisácea con fino barrado de blanco. **Ceja y garganta blancas.** Vientre blancuzco barrado de pardo. Largas patas blancas. Notable iris amarillo. J: de coloración más oscura, sin barrado.



LLANURA DE LA CUEVA DEL OSO

Frecuencia de observación



BAJA



Martín Pescador Grande

Megaceryle torquata
Ringed kingfisher

CRO

40 cm. Grande. Característico matraqueo. **Dorso y cabeza azul grisáceo.** Notable collar blanco. **Ventre rufo** hasta zona caudal donde presenta una zona blanca. Alas del color del dorso con puntas negras. Cola barrada de gris y blanco. Pico grande. ♀: con pecho del color del dorso. Línea blanca divide el pecho del vientre.



LAGO

Frecuencia de observación



BAJA



MD



Carpintero Blanco

Melanerpes candidus
White Woodpecker

FR

24 cm. En grupos. Inconfundible por su **plumaje mayoritariamente blanco**, con espalda y alas negras. Nuca amarilla. Llamativo **periocular amarillo** e **iris celeste.** ♀: Sin nuca amarilla.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia de observación



MEDIA



FR



Carpintero del Cardón

Melanerpes cactorum

White fronted Woodpecker

EP

16 cm. En **pequeños grupos**. Muy común y fácil de detectar por su canto. Frente y nuca blanca. Dorsal negro con alas, cola y rabadilla barrados. Garganta amarilla.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Carpintero Bataraz Chico

Venilornis mixtus

Checkered Woodpecker

LV



15 cm. **Solitario o en parejas**. Confiado y **trepador enérgico**. Bataraz. Frente negra con estriado blanco. **Nuca roja**. ♀: Sin nuca roja.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD


Frecuencia
de observación



BAJA



FR



Carpintero Real

Colaptes melanochloros
Green-barred woodpecker

FR

FR

23 cm. **Terrícola**. Emite distintas vocalizaciones. Frente y corona negra, **nuca roja** y post ocular blancuzco. Garganta estriada de negra. Pecho y vientre **amarillo-verdoso** con punteado de negro. Dorso negro barrado de amarillento. Zona malar con rojo. ♀: Sin rojo en la zona malar.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Carpintero Campestre

Colaptes campestris
Field Flicker

FR

FR

28 cm. Grande. **Muy terrícola**. En grupos. Cara y pecho de un **amarillo intenso**. Frente, corona y nuca negra. Dorsal y ventral barrado de negro. **Mancha malar roja**. ♀: Sin mancha malar roja.



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



BAJA



Carancho

Caracara plancus

Southern crested-caracara

EP

♂ 50 cm ♀ 60 cm. En pareja o en grupos. Caza pero también se lo puede ver alimentándose de carroña. **Vientre y corona negra.** Garganta blancuzca. Cuello y pecho ocráceo barrados de negro. **Alas negruzcas.** En vuelo se pueden apreciar manchas blancas en las alas. **Cola blancuzca con punta negra.** Pico de una leve coloración celeste. J: de coloración general parduzca. Con estrías en lugar de barras. La cera tiene distintas coloraciones.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Chimango

Daptrius chimango

Chimango caracara

FR

♂ 37 cm ♀ 43 cm. Confundible con Carancho (*Caracara plancus*). **Coloración general pardo clara.** Una fina línea negra le recorre la cara por sobre el ojo. **Cola blanquecina** con punta oscura. **Vientre pardo, barrado.** **Cola blancuzca.** Patas amarillas. En vuelo se aprecian manchas blancas en las puntas de las alas. J: con patas celestes. Más pálido.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Halconcito Colorado

Falco sparverius
American kestrel

FR



FR



♂ 25 cm ♀ 30 cm. Se mantiene estático en el aire a la hora de cazar (halconeando). Corona de color plumiza. Cara blanquecina con dos líneas negras verticales. **Dorso y parte superior de la cola de color rufo. Alas plumizas con pequeñas manchas negras.** Ventral blanquecino, también con pequeñas manchas negras. ♀: Sin plumizo en las alas. Dorsal y alas de color rufo, barradas. Ventral blanquecino con estrías pardas.



LAGO



BARRANCAS DEL PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD

Frecuencia de observación



MEDIA



Cotorra

Myiopsitta monachus
Monk parakeet

FR

28 cm. **Único loro del Parque.** Vive en colonias. **Coloración general verde brillante.** Cara, cuello y pecho blancos. Pico naranja claro. Alas con borde azulado, bien notable en vuelo.



BARRANCAS DEL PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA LEONA E INMEDIACIONES DEL SKATE PARK



LLANURA DE LA CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE

Frecuencia de observación



ALTA



Chinchero Grande

Drymornis bridgesii

Scimitar-billed woodcreeper

CRE

28 cm. Terrícola y trepador en menor medida. Notable y característico **pico largo y curvo**. Coloración general marrón con dorso claro y el semicopete más oscuro. **Ceja y línea malar blancas**. Garganta y vientre blancuzcos con estriado marrón. Cola marrón oscura.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Hornero

Furnarius rufus

Rufous hornero

EP

18 cm. El ave nacional. Canta a dúo. Comúnmente en pareja. **Coloración general parda, amarronada**. Más claro en pecho y vientre. Garganta blanca. Iris pardo anaranjado. Cola rufa.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Coludito Copetón

Leptasthenura platensis
Tufted tit-spinetail

FR

15 cm. Inquieto. Acrobático. Coloración general gris parduzca. **Notable copete** con pequeñas estrias negras. Pequeño pico oscuro. En el vientre es de coloración más pálida. Alas pardas, más oscuras que el resto del cuerpo. **Larga cola que termina en una horquilla con las puntas algo más oscuras.**



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD

Frecuencia
de observación



BAJA



Cacholote Castaño

Pseudoseisura lophotes
Brown cacholote

EP

25 cm. Canta a dúo. Generalmente en pareja. **Coloración general marrón.** Copete y cara oscuros. Cola rufa. **Iris marfil.** Pico grisáceo con punta oscura.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Cortarramas

Phytotoma rutila
White-tipped Plantcutter

MD



17 cm. Solitario o en pareja. Canto raspante. **Frente, garganta, pecho y vientre de un notable color rufo.** Dorso plumizo. **Iris anaranjado.** Alas negruzcas con bandas blancas. Cola negra con punta blanca. Pico grueso.
♀: De coloración pardo clara. Completamente estriada.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD

Frecuencia
de observación



BAJA



FR



Birro Colorado

Hirundinea ferruginea
Cliff flycatcher

CRO

16 cm. Se posa en alturas y caza insectos mediante vuelos acrobáticos. **Coloración general rufa.** Dorso parduzco. **Alas negruzcas.** Punta de la cola negra.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



BAJA



Suirirí Gris

Suiriri suiriri

Suiriri Flycatcher

FR

14 cm. En pequeños grupos. Vuelo elástico. El canto recuerda a una risa. **Dorsal grisáceo**, más oscuro en cabeza y cuello. **Garganta blanca**. Vientre blanco con pequeña porción amarillenta. Alas oscuras con filetes blancos. Cola oscura.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD

Frecuencia
de observación



BAJA



Piojito Trinador

Serpophaga griseicapilla
White-bellied Tyrannulet

CRO

8 cm. Chiquito y movedizo. Es el piojito más frecuente en el Parque. **Cabeza gris, espalda marrón-oliva, garganta blanquecina y vientre amarillo**. Casi indistinguible del Piojito tiquitiqui (*Serpophaga subcristata*)



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD

Frecuencia
de observación



BAJA



Churrinche

Pyrocephalus rubinus
Vermilion Flycatcher

13 cm. Posado en lo alto realizando **vuelos elásticos**. Característico **color rojo** con antifaz, dorso y alas negras. Cola lobulada. ♀: Cabeza y dorso pardo, ventral estriado con subcaudal rojizo. J: Igual a hembra con subcaudal amarillento y parches rojos. Poco frecuente en invierno.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA

FP



FR



Viudita Trinadora

Knipolegus aterrimus
White-winged Black-Tyrant

17 cm. **Negra** con **bandas blancas** notables en vuelo. ♀: Cabeza gris plumbea, ventral claro. Subcaudal y abdomen canela claro. Rabadilla y parte de cola rufa. Alas con dos filetes blancuecinos.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



LAGO

Frecuencia
de observación



BAJA

FP



FR



Monjita Blanca

Xolmis irupero
White Monjita

CRE

18 cm. Realiza vuelo elástico. **Blanca.** Pico e iris negro. Borde de las alas y punta de la cola negra. Presente sólo en otoño e invierno.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO

Frecuencia
de observación



BAJA



Gaucha chico

Agriornis murinus
Gray-bellied Shrike-Tyrant

17 cm. Terrícola y de arbustos bajos. Dorsal grisáceo. **Garganta blanca con finas estrias negruzcas.** Pecho **pardo**, con vientre blanquecino. Pico pequeño. Filetes claros en las alas. Presente sólo en otoño e invierno.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO

Frecuencia
de observación



BAJA



FR

Picabuey

Machetornis rixosa
Cattle Tyrant

FR

18 cm. Suele **estar cerca del suelo y realizar carreritas al alimentarse.** Ventral amarillo. Cabeza grisácea. Garganta blancuzca. Dorsal parduzco



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Benteveo

Pitangus sulphuratus
Great Kiskadee

EP

22 cm. Voz aguda muy conocida. **Vientre amarillo.** Gran pico negro con gancho en punta. **Corona y antifaz negros.** Ceja y garganta blancas. Dorso pardo. J: Comisuras del pico amarillas.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Tuquito Gris

Empidonomus aurantioatrocristatus
Crowned Slaty Flycatcher

FR

17 cm. **Posado en lo alto realizando vuelos elásticos.** Coloración general **grisácea**. Dorso gris parduzco. **Corona negra**. Pico negro. Ceja gris más clara. Alas y cola pardas J: Ceja blanca más notoria que la del adulto, cola y alas con rufo. Solo observable en primavera y verano.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



BAJA



Suirirí Real

Tyrannus melancholicus
Tropical Kingbird

LN

21 cm. **Posado en lo alto realizando vuelos elásticos.** Cabeza gris. Línea más oscura en el ojo. Pico negro. Garganta y pecho claros. **Ventral amarillo**. Dorso oliváceo pardo. Alas pardas con bordes de plumas claras. Larga cola furcada. Solo observable en primavera y verano.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



LAGO

Frecuencia
de observación



BAJA



Juan Chiviro

Cyclarhis gujanensis

Rufous-browed Peppershrike

15 cm. Recorre árboles y arbustos. Más oído que visto. **Ceja castaña.** Mejillas y nuca grises. Iris naranja. Pico ancho. **Dorso oliva.** Pecho amarillo y resto de ventral blancuzco.



LAGO

Frecuencia de observación



BAJA

OR



Golondrina Negra

Progne elegans

Southern Martin

18 cm. Caza en vuelo. En grupos. **Dorso y ventral negro violáceo brillante.** Alas negro opaco. Ventral de las alas y cola claros. Cola más furcada que Progne tapera. ♀: Ventral pardo claro escamado. J: Como la hembra pero ventral más blanco. Presente sólo en primavera y verano.



BARRANCAS DEL PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA LEONA E INMEDIACIONES DEL SKATE PARK



LLANURA DE LA CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE

Frecuencia de observación



MEDIA



MZ



FR



Golondrina Parda

Progne tapera

Brown-chested Martin

FR



18 cm. Caza en vuelo. En grupos. **Dorso pardo.** Ventral y garganta blanco. **Collar y centro de pecho pardo.** Cola poco furcada. Presente sólo en primavera y verano.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Tacuarita Azul

Poliophtila dumicola

Masked Gnatcatcher

FR



12 cm. Inquieta. Recorre árboles y arbustos. **Gris azulada.** Ventral claro. Antifaz negro. Cola negra con plumas externas blancas. Alas negras con bordes de plumas blancas. ♀: Sin antifaz y con periorcular blanco



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD

Frecuencia
de observación



MEDIA



MD



Ratona

Troglodytes aedon
House Wren

FR

11 cm. Recorredora. Varias voces. Frecuente en áreas urbanizadas. **Pardo amarronada.** Ventral más claro. Alas con barras marrón oscuro. **Cola rufa con barras pardas oscuras.**



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Estornino Pinto

Sturnus vulgaris
Common Starling

FR

Exótica. 22 cm. Plumajes variados. **Negro tornasolado.** Manchado de blanco en otoño y pico oscuro. En invierno pico amarillo. En época reproductiva tornasolado intensificado y muy poco manchado con pico amarillo. J: Pardo claro sin pecas.



LAGO

Frecuencia
de observación



ALTA



Calandria Grande

Mimus saturninus

Chalk-browed Mockingbird

FR

26 cm. Territorial. Imita sonidos. Dorso pardusco estriado. Rabadilla más clara que resto de dorso. Ceja blanca. **Marcada línea negra sobre el ojo.** Ventral gris claro. Alas negruzcas con bordes blancos.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Calandria Real

Mimus triurus

White-banded Mockingbird

23 cm. Territorial. Imita sonidos. Dorsal grisáceo uniforme. **Rabadilla rufa.** **Característica cola con plumas exteriores blancas y centrales negras.** Banda blanca en alas contrastando con el negro de las otras plumas. Ceja blancuzca. Línea negra sobre el ojo. Ventral grisáceo más claro que dorso.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



EP

Zorzal Colorado

Turdus rufiventris
Rufous-bellied Thrush

OR

24 cm. Dorso parduzco. **Llamativo abdomen y subcaudal rojo anaranjado.** Pecho grisáceo. Garganta blancuzca estriada. Pico amarillento. Periocular amarillo. ♀: Sin pico amarillo. J: Pecho con máculas.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



LAGO

Frecuencia
de observación



MEDIA



Zorzal Chalchalero

Turdus amaurochalinus
Creamy-bellied Thrush

FR

23 cm. **Dorso pardo.** Ventral claro que va desde pecho gris a abdomen blancuzco. Loral oscuro. **Garganta blanca con estriado.** Pico amarillo. J: Pecho con máculas. ♀: Sin pico amarillo



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



LAGO

Frecuencia
de observación



BAJA



Gorrión

Passer domesticus
House sparrow

Exótica. 13 cm. Muy urbano. Dorso con estriás castañas y negras. **Garganta y pecho negro.** Mejilla blancuzcas. Corona gris plumiza. Nuca castaña. Pico grueso y oscuro. ♀: Sin garganta y pecho negros ni corona castaña. Marcada ceja pardo claro. J: En machos progresivamente presenta plumas negras en garganta y pecho hasta completar coloración.




CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE

Frecuencia de observación



MEDIA

OR



OR



Chingolo

Zonotrichia capensis
Rufous-collared Sparrow

14 cm. Frecuente en espacios urbanizados. **Cabeza gris con semi-copete retráctil con dos líneas negras** (pueden estar ausente según raza), malar y detrás del ojo presentando líneas negras. **Cuello con rufo en dorsal y laterales.** Garganta blanca con dos manchas negras debajo. Ventral grisáceo. Dorso rufo claro estriado de negro. J: Pecho estriado. Sin Rufo. Líneas de la cabeza marrones.



BARRANCAS DEL PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD

Frecuencia de observación



MEDIA

FR



Boyerito

Icterus pyrrhopterus
Variable oriole

MZ

20 cm. Acrobático. Imita cantos. **Negro con hombros rufos.** Cola larga. Iris rojizo.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



LAGO

Frecuencia
de observación



BAJA



Tordo Pico Corto

Molothrus rufoaxillaris
Screaming cowbird

20 cm. Gregario, se lo puede ver formando bandadas con las otras especies de tordos presentes en el parque. **Negro más opaco y pico más corto y triangular que el Tordo renegrido.** J: Especie parásita de el Tordo músico por lo que imita su plumaje pero sin loral negro, progresivamente desarrolla manchas negras hasta completar su plumaje.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



MEDIA

EP



Tordo Renegrido

Molothrus bonariensis
Shiny cowbird

FR

OR

20 cm. Gregario, se lo puede ver formando bandadas con las otras especies de tordos presentes en el parque. **Negro tornasolado.** ♀: Gris parduzca. J: Como hembra pero con ventral estriado.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Tordo Músico

Agelaioides badius
Grayish baywing

MZ

18 cm. Gregario, se lo puede ver formando bandadas con las otras especies de tordos presentes en el parque. Coloración general grisácea. Loral negro. **Alas con notables colores castaños y negros.** Cola negruzca.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



ALTA



Varillero Congo

Chrysomus ruficapillus
Chestnut-capped blackbird

LV

FP

18 cm. Gregario. Coloración general negra. **Corona y garganta castañas.** ♀ y J: Ventral pardo suavemente estriado. Dorsal más oscuro con estriado negro.



LAGO

Frecuencia de observación



BAJA



Fueguero

Piranga flava
Red tanager

FR

FR

18 cm. Recorriendo el dosel. Caza insectos en vuelo. El canto es una sucesión de silbidos espaciados entre sí. **Coloración general roja.** Dorsal rufo. ♀: **Amarilla olivácea** con dorso más oscuro. J: Amarillento con partes rojas



LAGO



PRADERA DE LA LEONA E INMEDIACIONES DEL SKATE PARK

Frecuencia de observación



BAJA



Cardenal Copete Rojo

Paroaria coronata
Red-crested cardinal

FR

17 cm. **Característica cabeza y copete rojo.** Garganta y pecho rojos. Dorsal plumizo. Ventral blanco. ♀ y J: Más opaco



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



MEDIA



Monterita de Collar

Microspingus torquatus
Ringed warbling-finch

FR

12 cm. Recorredora. Dorso y corona plumizo. Ceja y garganta blanca. **Franja ocular, sobreceja y collar negros.** Ventral blanco. **Subcaudal canela.** Alas negro grisáceas con banda blanca. Cola negra con puntas blancas. J: Más opaco



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD

Frecuencia
de observación



BAJA



Naranjero

Raenia bonariensis
Blue and yellow tanager

FR



FR



17 cm. Arborícola. **Cabeza celeste con loral negro.** Semicollar y dorso negro. **Pecho y rabadilla anaranjado. Vientre amarillo.** Alas y cola negras con celeste. ♀: Más opacas, cabeza con poco celeste, ventral oliváceo, dorso pardo.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO

Frecuencia
de observación



BAJA



Monterita Canela

Poospiza ornata
Cinnamon warbling-finch

FR

12 cm. En pequeños grupos. Cabeza con predominante color gris plumizo. **Ceja canela claro. Ventral canela.** Dorso, parte de flancos y pecho rufo. Alas negruzcas con dos filetes blancos. ♀: Dorso gris claro y ventral canela, también más claro. J: Ventral estriado. **Endémica de Argentina.**



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



BAJA



Jilguero Dorado

Sicalis flaveola
Saffron finch

MZ

12 cm. Suele verse en pareja o grupos.
Coloración general amarillo dorado. Frente anaranjada. Dorso oliváceo estriado. Alas de coloración negra con amarillo. ♀ y J: Grisáceos estriados con poco o nada de amarillo.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



PRADERA DE LA
LEONA E
INMEDIACIONES DEL
SKATE PARK



LLANURA DE LA
CUEVA DEL OSO



LAGO



CIRCUITO DE
MOUNTAIN BIKE

Frecuencia
de observación



BAJA



Pepitero de Collar

Saltator aurantirostris
Golden-billed saltator

FR

19 cm. Solitario o en pareja. Dorso gris plumizo. **Cara, laterales del cuello y collar negros.** Ceja y garganta blanca. **Grueso pico naranja.** Ventral gris acanelado. ♀ y J Más opacos y pico negruzco.



BARRANCAS DEL
PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD

Frecuencia
de observación



ALTA



FR



Especies registradas en algún momento en el parque pero no frecuentes

Inambú Campestre (*Nothura maculosa*)
Pato Capuchino (*Spatula versicolor*)
Pato Gargantilla (*Anas bahamensis*)
Pato Maicero (*Anas georgica*)
Macá Cara Blanca (*Rollandia rolland*)
Yerutí Gris (*Leptotila verreauxi*)
Atajacaminos Chico (*Setopagis parvula*)
Urutaú (*Nyctibius griseus*)
Vencejo de Collar (*Streptoprocne zonaris*)
Chiricote (*Aramides cajaneus*)
Jacana (*Jacana jacana*)
Garcita Bueyera (*Bubulcus ibis*)
Cuervillo de Cañada (*Plegadis chihi*)
Cuervillo Cara Pelada (*Phimosus infuscatus*)
Jote Cabeza Colorada (*Cathartes aura*)
Caracolero (*Rostrhamus sociabilis*)
Gavilán Mixto (*Parabuteo unicinctus*)
Aguila Mora (*Geranoaetus melanoleucus*)
Aguilucho Langostero (*Buteo swainsoni*)
Alilicucú Común (*Megascops choliba*)
Lechuzón orejudo (*Asio clamator*)
Martín Pescador Chico (*Chloroceryle americana*)
Carpinterito Barrado (*Picumnus cirratus*)
Halcón Plomizo (*Falco femoralis*)
Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*)
Chororó (*Taraba major*)
Chincherito Chico (*Lepidocolaptes angustirostris*)
Hornerito copetón (*Furnarius cristatus*)
Junquero (*Phleocryptes melanops*)
Bandurrita esteparia (*Upucerthia dumetaria*)
Remolinera Parda (*Cinclodes fuscus*)
Canastero Chaqueño (*Asthenes baeri*)
Canastero Coludo (*Asthenes pyrrholeuca*)
Curutié Blanco (*Cranioleuca pyrrhophia*)
Pijuí Cola Parda (*Synallaxis albescens*)
Piojito Silbón (*Camptostoma obsoletum*)
Cachudito Pico Amari lo (*Anairetes flavirostris*)
Fiofío Pico Corto (*Elaenia parvirostri*)
Fiofío Silbón (*Elaenia albiceps*)
Mosqueta Estriada (*Myiophobus fasciatus*)

Piojito Tiquitiqui (*Serpophaga subcristata*)
Calandrita (*Stigmatura budytoides*)
Mosqueta Estriada (*Myiophobus fasciatus*)
Suirirí Pico Corto (*Sublegatus modestus*)
Pico de Plata (*Hymenops perspicillatus*)
Monjita Coronada (*Neoxolmis coronatus*)
Burlisto Pico Canela (*Myiarchus swainsoni*)
Benteveo Rayado (*Myiodynastes maculatus*)
Tijereta (*Tyrannus savana*)
Golondrina Barranquera (*Pygochelidon cyanoleuca*)
Golondrina Cabeza Rojiza (*Alopochelidon fucata*)
Golondrina Doméstica (*Progne chalybea*)
Golondrina Ceja Blanca (*Tachycineta leucorrhoa*)
Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*)
Calandria Mora (*Mimus patagonicus*)
Zorzal Chiguanco (*Turdus chiguanco*)
Cabecitanegra (*Spinus magellanicus*)
Cachilo Ceja Amarilla (*Ammodramus humeralis*)
Arañero Cara Negra (*Geothlypis velata*)
Pitiayumí (*Setophaga pitiayumi*)
Arañero Corona Rojiza (*Myioborus brunniceps*)
Reinamora Grande (*Cyanoloxia brissonii*)
Monterita Cabeza Negra (*Microspingus melanoleucus*)
Celestino (*Thraupis sayaca*)
Diuca (*Diuca diuca*)
Yal Carbonero (*Rhopospina carbonaria*)
Misto (*Sicalis luteola*)
Corbatita (*Sporophila caerulescens*)
Brasita de Fuego (*Coryphospingus cucullatus*)
Pepitero Chico (*Saltatricula multicolor*)



Glosario



- Antifaz: línea marcada en la zona ocular.
- Banda (alar): franja de color.
- Barrado: con barras o líneas en sentido horizontal.
- Bataraz: diseño que combina manchitas blancas y negras.
- Bullanguero: que emite mucho ruido.
- Carroña: carne en descomposición de animales muertos.
- Caudal: parte posterior del ave.
- Ceja: zona de plumaje coloreada sobre el ojo.
- Cera: membrana carnosa en la base del pico.
- Cola ahorquillada: con los extremos separados en forma de ángulo como la horquilla.
- Cola furcada: dividida en dos ramas formando una V.
- Copete: plumas sobresalientes en la parte superior de la cabeza.
- Corona: parte superior de la cabeza.
- Dedos lobulados: dedos con lóbulos o extensiones laterales que no llegan a formar membrana, típicos de aves acuáticas.
- Dorso: parte superior.
- Dosel: techo formado por la copa de los árboles.
- Ecorregión: área geográfica con flora, fauna y ecosistemas característicos.
- Endémica: especie que se encuentra solo en una región geográfica.
- Escamas: estructuras en el plumaje que se asemejan a escamas.
- Escudete: prolongación del pico sobre la frente.
- Espolón: proyecciones óseas presentes en alas o patas.
- Estriado: estrias o líneas de color cortas en sentido vertical.
- Exótica: especie originaria de otra región y no nativa del área.
- Filetes: líneas delgadas en las alas.
- Gregario: tendencia de una especie a agruparse con individuos de su misma especie o de otras.
- Iris: parte coloreada del ojo.
- Lomo: espalda del ave.
- Loral: zona entre el pico y el ojo.
- Máculas: manchas bien contrastadas.
- Malar: área comprendida entre las zonas auricular, loral y gular.
- Nativa: especie originaria de la región.
- Palmeado: dedos unidos por una membrana.
- Pardo: color marrón oscuro grisáceo.
- Percha: posadero de ave.
- Periocular: alrededor del ojo.
- Plumaje críptico: plumaje que se mezcla con el entorno y hace difícil su detección.
- Rufo: marrón rojizo.
- Subcaudal: debajo de la cola.
- Tamborileo: Golpeteo en superficies, característico de los carpinteros.
- Taxón: agrupación de seres vivos con características en común.
- Terrícola: que suele estar en el suelo.
- Ventral: parte inferior.
- Vibrisas: plumas rígidas alrededor del pico.
- Vuelo elástico: corto vuelo que vuelve a la percha.



Bibliografía

- Bruno, G. y Vivas, E. (2020). Aves del Mar de Ansenusa: guía de campo. Córdoba: Ecoval Editorial.
- De la Peña, M. R. (2015). Aves Argentinas. Tomo 1 y 2. Buenos Aires: Eudeba.
- Narosky, T. (2010). Aves de Argentina y Uruguay; guía de identificación total. Buenos Aires: Vázquez Mazzini Editores.
- López-Lanús, B. (2020). Guía Audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos; identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes. Buenos Aires: Audior-nis Producciones.

Sitios web consultados

- BioCórdoba. 2020. Ente Municipal BioCórdoba. Córdoba. Argentina. Disponible en: <https://biocordoba.cordoba.gob.ar/> (Consultado: agosto 2023)
- EBird. 2021. eBird: una base de datos en línea sobre la distribución y abundancia de aves [aplicación web]. eBird, Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, Nueva York. Disponible en: <http://www.ebird.org> (Consultado: agosto 2023).

Índice de Especies

Atajacaminos Ñañarca (<i>Systellura longirostris</i>)	Pág 13
Atajacaminos Tijera (<i>Hydropsalis torquata</i>)	Pág 13
Benteveo (<i>Pitangus sulphuratus</i>)	Pág 34
Biguá (<i>Nannopterum brasilianum</i>)	Pág 18
Birro Colorado (<i>Hirundinea ferruginea</i>)	Pág 30
Boyerito (<i>Icterus pyrrhopterus</i>)	Pág 42
Caburé Chico (<i>Glaucidium brasilianum</i>)	Pág 22
Cacholote Castaño (<i>Pseudoseisura lophotes</i>)	Pág 29
Calandria Grande (<i>Mimus saturninus</i>)	Pág 39
Calandria Real (<i>Mimus triurus</i>)	Pág 39
Carancho (<i>Caracara plancus</i>)	Pág 26
Carau (<i>Aramus guarauna</i>)	Pág 17
Cardenal Copete Rojo (<i>Paroaria coronata</i>)	Pág 45
Carpintero Bataraz Chico (<i>Dryobates mixtus</i>)	Pág 24
Carpintero Blanco (<i>Melanerpes candidus</i>)	Pág 23
Carpintero Campestre (<i>Colaptes campestris</i>)	Pág 25
Carpintero del Cardón (<i>Melanerpes cactorum</i>)	Pág 24
Carpintero Real (<i>Colaptes melanochloros</i>)	Pág 25
Chimango (<i>Daptrius chimango</i>)	Pág 26
Chincheró Grande (<i>Drymornis bridgesii</i>)	Pág 28
Chingolo (<i>Zonotrichia capensis</i>)	Pág 41
Churrinche (<i>Pyrocephalus rubinus</i>)	Pág 32
Coludito Copetón (<i>Leptasthenura platensis</i>)	Pág 29
Cortarramas (<i>Phytotoma rutila</i>)	Pág 30
Cotorra (<i>Myiopsitta monachus</i>)	Pág 27
Estornino Pinto (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Pág 38
Fueguero (<i>Piranga flava</i>)	Pág 44
Gallareta Chica (<i>Fulica leucoptera</i>)	Pág 17
Gallareta Escudete Rojo (<i>Fulica rufifrons</i>)	Pág 16
Gallareta Ligas Rojas (<i>Fulica armillata</i>)	Pág 16
Garcita Azulada (<i>Butorides striata</i>)	Pág 20
Garcita Blanca (<i>Egretta thula</i>)	Pág 19
Garza Blanca (<i>Ardea alba</i>)	Pág 19
Garza Bruja (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	Pág 20
Gaucho chico (<i>Agriornis murinus</i>)	Pág 33
Golondrina Negra (<i>Progne elegans</i>)	Pág 36
Golondrina Parda (<i>Progne tapera</i>)	Pág 37
Gorrión (<i>Passer domesticus</i>)	Pág 41
Halconcito Colorado (<i>Falco sparverius</i>)	Pág 27
Hornero (<i>Furnarius rufus</i>)	Pág 28
Jilguero Dorado (<i>Sicalis flaveola</i>)	Pág 47
Jote Cabeza Negra (<i>Coragyps atratus</i>)	Pág 21

Juan Chiviro (<i>Cyclarhis gujanensis</i>)	Pág 36
Lechucita Vizcachera (<i>Athene cunicularia</i>)	Pág 22
Martín Pescador Grande (<i>Megaceryle torquata</i>)	Pág 23
Monjita Blanca (<i>Xolmis irupero</i>)	Pág 33
Monterita Canela (<i>Poospiza ornata</i>)	Pág 46
Monterita de Collar (<i>Microspingus torquatus</i>)	Pág 45
Naranjero (<i>Rauenia bonariensis</i>)	Pág 46
Paloma Doméstica (<i>Columba livia</i>)	Pág 10
Paloma Manchada (<i>Patagioenas maculosa</i>)	Pág 11
Paloma Picazuró (<i>Patagioenas picazuro</i>)	Pág 10
Pato Barcino (<i>Anas flavirostris</i>)	Pág 9
Pato de Collar (<i>Callonetta leucophrys</i>)	Pág 9
Pepitero de Collar (<i>Saltator aurantirostris</i>)	Pág 47
Picabuey (<i>Machetornis rixosa</i>)	Pág 34
Picaflor Cometa (<i>Sappho sparganurus</i>)	Pág 14
Picaflor de Barbijo (<i>Heliomaster furcifer</i>)	Pág 14
Picaflor Verde (<i>Chlorostilbon lucidus</i>)	Pág 15
Pirincho (<i>Guira guira</i>)	Pág 12
Piojito Trinador (<i>Serpophaga griseicapilla</i>)	Pág 31
Pollona Negra (<i>Gallinula galeata</i>)	Pág 15
Ratona (<i>Troglodytes aedon</i>)	Pág 38
Suirirí Gris (<i>Suiriri suiriri</i>)	Pág 31
Suirirí Real (<i>Tyrannus melancholicus</i>)	Pág 35
Tacuarita Azul (<i>Polioptila dumicola</i>)	Pág 37
Taguató (<i>Rupornis magnirostris</i>)	Pág 21
Tero (<i>Vanellus chilensis</i>)	Pág 18
Torcacita Picuí (<i>Columbina picui</i>)	Pág 11
Torcaza (<i>Zenaida auriculata</i>)	Pág 12
Tordo Músico (<i>Agelaioides badius</i>)	Pág 43
Tordo Pico Corto (<i>Molothrus rufoaxillaris</i>)	Pág 42
Tordo Renegrado (<i>Molothrus bonariensis</i>)	Pág 43
Tuquito Gris (<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>)	Pág 35
Varillero Congo (<i>Chrysomus ruficapillus</i>)	Pág 44
Viudita Trinadora (<i>Knipolegus aterrimus</i>)	Pág 32
Zorzal Chalchalero (<i>Turdus amaurochalinus</i>)	Pág 40
Zorzal Colorado (<i>Turdus rufiventris</i>)	Pág 40



Esta guía tiene el objetivo de dar a conocer la gran diversidad de aves que habitan el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Las mismas han sido registradas y recopiladas por el equipo de trabajo del área de Educación Ambiental en los últimos años mediante diferentes formas de relevamiento, como monitoreos específicos y avistajes ocasionales.



Noviembre 2023